

ریفلاکس نفروپاتی (برگشت ادرار از مثانه به حالب) :

تخلیه ناکامل حالب و مثانه بیمار را مستعد عفونت مجاری، ریفلاکس مثانه به حالب برگشت جریان ادرار از مثانه به حالب یا کلیه است بدون تخلیه کامل مجاری ادراری، ادرار کردن از تجمع باکتری جلوگیری نمی کند که پس از مدتی باعث آسیب به بافت، ادراری میکند. کلیه می گردد.

به نظرمی رسد علت این بیماری بی کفایتی مادرزادی محل اتصال حالب به مثانه است و می تواند خانوادگی باشد. احتمال ابتلای خواهر یا برادر کودک مبتلا به ریفلاکس ۳۰ درصد است. ریفلاکس ممکن است ثانویه به افزایش فشار داخل مثانه باشد که در اثر التهاب و عفونت مثانه ایجاد گردیده است.

علائم هشدار دهنده آن برای والدین چیست ؟ در صورت وجود تب، عفونت مکرر ادراری، کم شدن میزان ادرار، تهوع، استفراغ، ورم و افزایش ناگهانی وزن، به پزشک مراجعه نمایید.

یا سیستمیورتروگرافی که در حال ادرار نوعی ماده (این بیماری با عکسبرداری از سیستم ادراری : چگونه تشخیص داده می شود و همچنین از طریق روشهای تخصصی تشخیصی دیگر (بیمار تزریق می گردد یا ماده حاجب از طریق سوند ادراری به رادیوگرافی مانند اسکن رادیو ایزوتوپ تشخیص داده می شود

عوارض برگشت ادراری، از درمان این بیماری چه باید بدانیم؟ درمان با آنتی بیوتیک پیشگیری کننده به مدت طولانی ضروری است. باشد (5 و 4 درجه) و جراحی (2 و 1 درجه) افزایش فشار خون و نارسایی کلیه است که بسته به درجه ریفلاکس میتواند طبی

توصیه میشود مصرف دارو راتا تکمیل دوره درمانی، از آنتی بیوتیکها برای پیشگیری به مدت طولانی استفاده میشود: درمان دارویی هرگونه علائم مانند تهوع و استفراغ، اسهال، واکنشهای حساسیتی، بثورات پوستی، طبق راهنمایی صورت گرفته دقیقاً ادامه دهید. و خارش به پزشک اطلاع دهید.

چه عوارضی به دنبال این بیماری ایجاد میشود؟

، آسیب کلیه و نارسایی کلیه (عفونت لگنچه کلیه) ریفلاکس و عفونت ادراری می تواند منجر به بروز عوارض خطرناکی نظیر پیلونفریت، در موارد شدید بیماری گردد.

آنچه که والدین باید بدانند :

صحیح گرفتن هدف اصلی این آموزش پیشگیری از عفونت ادراری، صدمه به کلیه و نارسایی کلیه است و بهتر است که مادر طرز و در صورت بروز آن به پزشک اطلاع دهد (....، تب، بیقراری، سوزش، تکرر ادرار و) نمونه ادرار و علائم عفونت ادراری را بداند.

ابتدا ناحیه ادراری کودک با آب و صابون شستشو داده شده سپس از وسط ادرار نمونه گرفته شود: طرز گرفتن صحیح نمونه ادرار دقت شود که هنگام نمونه گیری ظرف ادرار با جایی تماس پیدا نکند.

رژیم غذایی و فعالیت این بیماران به چه صورت است؟ این بیماران محدودیت فعالیت و رژیم غذایی ندارند .