



آموزش به بیمار

آمیپیم (گسترش عفونت به پرده جنب)



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان کودکان دکتر شیخ
واحد آموزش به بیمار

کد سند: DSKH-PAM107

تاریخ تدوین: خرداد ۱۳۹۵ بازنگری ششم: آذر ۱۴۰۱

بازنگری بعدی: آذر ۱۴۰۳

روشهای دسترسی به آموزش مجازی بیمارستان دکتر شیخ
مراجعه به وب سایت بیمارستان لینک آموزش به بیمار به آدرس
<https://sheikh.mums.ac.ir/education/patient-education>

https://www.aparat.com/Dr.Sheikh_Hospital/videos
(فیلمهای آموزشی)

مستقیم به صفحه اسکن کد بانرم افزار بار کد خوان و ورود
مطالب آموزشی سایت بیمارستان



در صورت بروز هرگونه مشکل در مراقبت از کودک خود، می-
توانید همه روزه با پرستاران مجرب حاضر در کلینیک پرستاری
آموزش سلامت واقع در درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ به صورت
حضور یا از طریق تلفن زیر مشاوره دریافت فرمایید:

تلفن تماس: ۳۷۲۶۹۰۲۱ داخلی ۲۰۲

صبح ها: ساعت ۸ الی ۱۲

منبع:

<http://www.nursingconsult.com>

فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

تا زمانی که درد و تب برطرف نشده باشد فعالیت
بیمار در زمان ابتلا به این بیماری را کم کنید. سپس
فعالیت عادی خود را تدریجاً از سر بگیرید. بهبود
کامل حدود دو ماه زمان می برد.

رژیم غذایی

رژیم خاصی توصیه نمی شود مکمل های ویتامینی
بخورید و مایعات بیشتر بنوشید.

پیشگیری

در صورت بروز هر گونه بیماری یا عفونت جدی
که ممکن است باعث آمیپیم شود، برای درمان
سریعا به پزشک مراجعه کنید.

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مشکلات و بیماریهای ناشی از سیگار کشیدن و هوای سرد می باشد. امید است با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بروز کمتر این مشکلات باشیم.



آمپیم چیست؟

آمپیم معمولاً عارضه‌ای از عفونت‌های ریه یا قفسه سینه می‌باشد که به دنبال گسترش عفونت به پرده جنب رخ می‌دهد.

علت ؟

این بیماری معمولاً عارضه‌ای از عفونت‌های ریه یا قفسه سینه مثل ذات‌الریه و سل می‌باشد که به دنبال گسترش عفونت به پرده جنب رخ می‌دهد. در رحم، مننژ، آپاندیس و مفاصل نیز آمپیم دیده می‌شود. اما به طور معمول عفونت در فضای اطراف ریه ها و بین لایه های پرده جنب اتفاق می افتد.

علائم بیماری

۱. درد قفسه سینه
۲. تنفس تند و سطحی
۳. خستگی شدید
۴. سرفه خشک
۵. تنفس بد بو
۶. تب شدید
۷. تب

راه های تشخیص آمپیم:

۱. نمونه برداری و آزمایش چرک جمع شده و کشت آن
۲. رادیوگرافی قفسه سینه
۳. شمارش گلبول های سفید خون
۴. سی تی اسکن قفسه سینه
۵. سونوگرافی قفسه سینه

درمان !!!!

برای درمان معمولاً نیاز به تجویز دوز بالای آنتی بیوتیک وجود دارد و بیمار غالباً باید بستری گردد و تحت درمان قرار گیرد. بهتر است بدانید خارج کردن چرک از فضای کانون عفونی آن باعث تسریع بهبودی می گردد. بهبودی کامل حدود دو ماه زمان می برد تا درمان کامل شود.

جراحی برای باز کردن و تخلیه چرک، از طریق تعبیه چست تیوب در پرده جنب و قفسه سینه

عوارض

۱. مننژیت (عفونت پرده مغز)
۲. پریکاردیت (عفونت پرده دور قلب)
۳. آندوکاردیت (عفونت دریچه‌های قلب)
۴. آبسه مغز

عواقب مورد انتظار

درمان موفقیت‌آمیز به کشف و درمان بیماری زمینه‌ساز بستگی دارد. خارج کردن چرک از فضای تجمع چرک باعث تسریع بهبود می‌شود. برای درمان معمولاً نیاز به تجویز دوز بالای آنتی بیوتیک وجود دارد و بیمار غالباً باید بستری شود.