




آموزش به بیمار

بسته بودن بخشی از مری

(آترزی)



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان کودکان دکتر شیخ
واحد آموزش به بیمار

کد سند: DSKH-PAM02

تاریخ تدوین: بهمن ۹۳ بازنگری هشتم: آذر ۱۴۰۱

بازنگری بعدی: آذر ۱۴۰۳

روشهای دسترسی به آموزش مجازی بیمارستان دکتر شیخ
مراجعه به وب سایت بیمارستان لینک آموزش به بیمار به آدرس
<https://sheikh.mums.ac.ir/education/patient-education>

https://www.aparat.com/Dr.Sheikh_Hospital/videos
(فیلمهای آموزشی)

مستقیم به صفحه اسکن کد با نرم افزار بار کد خوان و ورود
مطالب آموزشی سایت بیمارستان



منبع:

<http://www.nursingconsult.com>

در صورت بروز هرگونه مشکل در مراقبت از کودک خود، می-
توانید همه روزه با پرستاران مجرب حاضر در کلینیک پرستاری
آموزش سلامت واقع در درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ به صورت
حضور یا از طریق تلفن زیر مشاوره دریافت فرمایید:

تلفن تماس: ۳۷۲۶۹۰۲۱ داخلی ۲۰۲

صبح ها: ساعت ۸ الی ۱۲

مراقبتهای بعد از عمل :

- بعد از عمل جراحی بیمار به مدت یک هفته در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بستری می شود و ۲ تا ۳ روز به کمک دستگاه، نفس می کشد.
- گاهی بعد از عمل جهت بیمارارن سوند تعبیه میشود که باید مراقب بود سوند به هیچ وجه خارج نشود.
- به مدت چند روز به کودک از راه دهان شیر داده نمی شود و پس از این مدت، عکسی از نوزاد گرفته می شود که پس از اطمینان از سالم بودن محل عمل، تغذیه شروع می گردد.
- توجه شود که زمان تغذیه سر نوزاد بالاتر از سطح بدن باشد.
- شروع تغذیه در ابتدا با حجم کم و اندک و با فاصله باشد.
- داروهای تجویز شده توسط پزشک تا کامل شدن دوره درمان به کودک داده شود.
- تا سن ۱۵ سالگی باید تحت نظر جراح اطفال باشد.

زمان بعدی مراجعه به پزشک

- تا ۳ ماه اول هفته ای یک بار
- تا سن یک سال هر ماه یک بار
- بعد از یک سالگی هر ۶ ماه یکبار تا سن ۱۵ سالگی

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکتان باشیم.



آترزی مری چیست؟

در این بیماری قسمتی از دستگاه هاضمه به نام مری به خوبی تشکیل نشده است (مری قسمتی است که مواد غذایی را از دهان به معده منتقل می کند).


این بیماری یک نقص مادرزادی است که قبل از تولد اتفاق می افتد و انواع مختلفی دارد.

علائم و نشانه ها

- کبود شدن پوست کودک در حین تغذیه
- سرفه و اوغ زدن در حین تغذیه
- خوب غذا نخوردن
- آبریزش از دهان

روش های تشخیصی

- قبل از تولد با آزمایش و سونوگرافی می توان این اختلال یا سایر اختلالات گوارشی را شناسایی نمود.
- بعد از تولد معمولاً با مشاهده ی علایمی مانند سرفه و کبود شدن و خروج ترشحات فراوان از دهان این بیماری تشخیص داده می شود.
- سپس پزشک یا پرستار با عبور دادن سوند معده از بینی یا دهان کودک و عبور نکردن این سوند با نتیجه قطعی می رسند.
- عکس ساده شکم، تجمع هوا در معده و روده کودک را نشان می دهد



درمان

آترزی مری به عنوان یک اورژانس جراحی می باشد. بنابراین جراحی ترمیمی مری بلافاصله بعد از مساعد شدن وضعیت کودک انجام می شود.

مراقبت های قبل عمل

- قبل از عمل کودک به هیچ وجه نباید از راه دهان غذا بخورد.



- ترشحات جمع شده در حلق، باید بطور متناوب با استفاده از پوار یا ساکشن خارج شود.

- باید سر نوزاد در وضعیت ۴۵ درجه به بالا و یک طرف نگه داشته شود تا ترشحات از دهان نوزاد خارج شود.

- در صورت تجمع ترشحات در دهان و بینی نوزاد و خروج کف از دهان و بینی فوراً پرستار را مطلع کنید.
- معمولاً داخل دهان یا بینی این نوزادان سوند قرار داده می شود؛ مراقب باشید که سوند خارج نشود و در صورت خروج سریعاً پرستار را مطلع کنید.