




آموزش به بیمار

مراقبت از لوله های (کاتتر) عروقی



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان کودکان دکتر شیخ
واحد آموزش به بیمار

کد سند: DSKH-PAM063

تاریخ تدوین: بهمن ۹۳ بازنگری هشتم: آذر ۱۴۰۱

بازنگری بعدی: آذر ۱۴۰۳

با آرزوی سلامتی برای شما و کودک عزیزتان

روشهای دسترسی به آموزش مجازی بیمارستان دکتر شیخ

مراجعه به وب سایت بیمارستان لینک آموزش به بیمار به آدرس

<https://sheikh.mums.ac.ir/education/patient-education>

https://www.aparat.com/Dr.Sheikh_Hospital/videos

(فیلمهای آموزشی)

اسکن کد با نرم افزار بار کد خوان و ورود مستقیم به

صفحه مطالب آموزشی سایت بیمارستان



در صورت بروز هرگونه مشکل در مراقبت از کودک خود، می توانید همه روزه با پرستاران مجرب حاضر در کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ به صورت حضوری یا از طریق تلفن زیر مشاوره دریافت فرمایید:

تلفن تماس: ۳۷۲۶۹۰۲۱ داخلی ۲۰۲

صبح ها: ساعت ۸ الی ۱۲

منبع: <http://www.nursingconsult.com>

در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر به

مرکز درمانی مراجعه شود:

- علایمی عفونت در محل ورود کاتتر مانند قرمزی، تورم، ترشح چرک از محل کاتتر، تب و لرز، درد پشت
- باز شدن بخیه های اطراف کاتتر
- در صورتی که کاتتر به طور اتفاقی خارج شد، محل خروج کاتتر را با گاز استریل جهت کنترل خونریزی فشار داده و به مرکز دیالیز مراجعه کنید.



این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکان باشیم.



کاتتر عروقی چیست؟

در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه که نیاز به انجام همودیالیز دارند، جهت انجام دیالیز دسترسی به عروق بزرگ بدن لازم می باشد. شایع ترین نوع این دسترسی که موقت است، استفاده از کاتتر عروقی می باشد.

در این روش یک کاتتر در یکی از رگ های بزرگ بدن (ناحیه گردن، کشاله ران، قفسه سینه) قرار داده می شود که تا ۶ هفته قابل استفاده می باشند اما به دلیل عوارضی از قبیل عفونت و خونریزی هر ۳-۴ هفته باید تعویض شوند.

این کاتترها در صورت مراقبت نادرست ممکن است دچار مشکلاتی از قبیل عفونت و پارگی رگ شود، بنابراین لازم است مراقبت صحیح از کاتتر را بیاموزید.

مراقبت از کاتتر عروقی

- پانسمان کاتتر پس از دیالیز تعویض و با پانسمان خشک استریل پوشانده می شود، باید آن را تمیز نگه دارید.
- هرگز کاتتر را حرکت ندهید و از خم کردن و خواباندن شاخه های کاتتر خودداری کنید.
- بعد از هر بار دوش گرفتن، اطراف کاتتر را با یک گاز استریل بپوشانید.
- از شنا کردن و قرار گرفتن طولانی مدت در آب در زمان داشتن کاتتر خودداری شود.
- در مواقعی که روی کاتتر باز است جهت پیشگیری از ورود میکروب ها از طریق کاتتر به جریان خون از ماسک استفاده شود.



- هرگز سر کاتتر به مدت طولانی در مجاورت هوا قرار نگیرد.
- دقت شود قسمت سرپوش کاتتر و گیره ها در زمانی که دیالیز انجام نمی شود، بسته باشد.
- از ایجاد ضربه یا ایجاد کشش به خصوص هنگام دیالیز جلوگیری شود.
- از کاتتر جهت گرفتن نمونه و تزریقات استفاده نشود.
- سعی شود موهای اطراف کاتتر کوتاه نگه داشته شود تا از عفونت محل کاتتر پیشگیری شود.
- در صورت کاتتر در ناحیه فمورال (رانی) می باشد رعایت بهداشت و استراحت در منزل لازم می باشد.
- هرگز از وسایل و اشیاء نوک تیز مانند قیچی، تیغ و ... در اطراف کاتتر استفاده نکنید.