




## آموزش به بیمار

### تیفلایتیس (التهاب روده بزرگ)



دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
بیمارستان کودکان دکتر شیخ  
واحد آموزش به بیمار

کد سند: DSKH-PAM080

تاریخ تدوین: بهمن ۹۳ بازنگری هشتم: آذر ۱۴۰۲

بازنگری بعدی: آذر ۱۴۰۳

## با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان

**روشهای دسترسی به آموزش مجازی بیمارستان دکتر شیخ**  
مراجعه به وب سایت بیمارستان لینک آموزش به بیمار به آدرس  
<https://sheikh.mums.ac.ir/education/patient-education>

[https://www.aparat.com/Dr.Sheikh\\_Hospital/videos](https://www.aparat.com/Dr.Sheikh_Hospital/videos)  
(فیلمهای آموزشی)

مستقیم به صفحه اسکن کد با نرم افزار بار کد خوان و ورود  
مطالب آموزشی سایت بیمارستان



در صورت بروز هرگونه مشکل در مراقبت از کودک خود، می-  
توانید همه روزه با پرستاران مجرب حاضر در کلینیک پرستاری  
آموزش سلامت واقع در درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ به صورت  
حضور یا از طریق تلفن زیر مشاوره دریافت فرمایید:

تلفن تماس: ۳۷۲۶۹۰۲۱ داخلی ۲۰۲

صبح ها: ساعت ۸ الی ۱۲

منبع: <http://www.nursingconsult.com>

## موارد نیاز به درمان جراحی

- گاهی اوقات ممکن است وضعیت کودک با درمان  
های انجام شده بهتر نشود بنابراین پزشک انجام  
جراحی را توصیه می کند.

## مراقبت

- باید هر گونه افزایش درد شکم، تغییر در اندازه دور  
شکم و عملکرد روده را به پزشک و پرستار اطلاع  
دهید.
- کودک نباید از راه دهان تغذیه شده و استراحت  
مطلق می باشد.
- برای پیشگیری از این بیماری باید در زمان ترخیص  
داروهای تجویز شده (کوتریموکسازول و آمپول سلول)  
به طور مرتب طبق دستور پزشک معالج مصرف شود.

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکتان باشیم.



### تیفلایتیس چیست؟

بیماری التهابی روده بزرگ می باشد. که با عفونت همراه می باشد که اغلب در بیمارانی که بعد از انجام شیمی درمانی دچار افت سلول شده اند ایجاد می شود. در این بیماری یکپارچگی مخاط روده دچار آسیب می شود.

### علت بیماری

این بیماری از عوارض شیمی درمانی می باشد که در آن دیواره داخلی روده دچار آسیب می شود.



### علائم

ممکن است کودک شما علائم و نشانه های زیر را داشته باشد، در صورت مشاهده این علائم به پزشک اطلاع دهید:

- اسهال، اتساع شکم، درد شکمی
- تب، لرز
- تهوع، استفراغ و حساسیت شکم به لمس

### تشخیص

این بیماری اغلب با سونوگرافی تشخیص داده می شود.

### درمان

- درمان این بیماری شامل موارد زیر می باشد:
- استراحت روده (ممکن است پزشک مدتی اجازه ی مصرف غذا به کودک ندهد تا روده ها استراحت نمایند).
  - نظارت دقیق بیمار با استفاده از معاینات مرتب شکم
  - تجویز سرم و ترانس خون و پلاکت در صورت نیاز
  - تزریق داروهای چرک خشک کن
  - ارسال کشت خون از نظر قارچ و شروع داروی ضد قارچ در صورتی که درمان به آنتی بیوتیک جواب ندهد.
  - عدم مصرف داروهایی مانند داروهای ضد اسهال و مواد مخدر زیرا باعث بدتر شدن وضعیت بیمار می شود.

