




آموزش به بیمار

التهاب روده بزرگ (تیفلایتیس)



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان کودکان دکتر شیخ
واحد آموزش به بیمار

کد سند: DSKH-PAM080
تاریخ تدوین: بهمن ۹۳ بازنگری هشتم: آذر ۱۴۰۱

بازنگری بعدی: آذر ۱۴۰۳

روشهای دسترسی به آموزش مجازی بیمارستان دکتر شیخ

مراجعه به وب سایت بیمارستان لینک آموزش به بیمار به آدرس

<https://sheikh.mums.ac.ir/education/patient-education>

https://www.aparat.com/Dr.Sheikh_Hospital/videos

(فیلمهای آموزشی)

اسکن کد با نرم افزار بار کد خوان و ورود مستقیم به

صفحه مطالب آموزشی سایت بیمارستان



در صورت بروز هرگونه مشکل در مراقبت از کودک خود، می‌توانید همه روزه با پرستاران مجرب حاضر در کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ به صورت حضوری یا از طریق تلفن زیر مشاوری دریافت فرمایید:

تلفن تماس: ۳۷۲۶۹۰۲۱ داخلی ۱۴۴

صبح ها: ساعت ۸ الی ۱۲

منبع: <http://www.nursingconsult.com>

موارد نیاز به درمان جراحی

- گاهی اوقات ممکن است وضعیت کودک با درمان های انجام شده بهتر نشود بنابراین پزشک انجام جراحی را توصیه می کند. این عارضه با آپاندیسیت مشابه است و تشخیص دقیق خیلی اهمیت دارد.

مراقبت

در صورت بروز هر یک از علائم زیر به پزشک و پرستار مربوطه اطلاع دهید

- تب
- درد شکم
- تهوع و استفراغ
- اسهال
- اتساع شکم

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکتان باشیم.



تیفلایتیس چیست؟

بیماری التهابی روده بزرگ می باشد. که با عفونت همراه می باشد که اغلب در بیمارانی که بعد از انجام شیمی درمانی دچار افت سلول شده اند ایجاد می شود. در این بیماری یکپارچگی مخاط روده دچار آسیب می شود.

علت بیماری

این بیماری از عوارض شیمی درمانی می باشد که در آن دیواره داخلی روده دچار آسیب می شود.



علائم

ممکن است کودک شما علائم و نشانه های زیر را داشته باشد، در صورت مشاهده این علائم به پزشک اطلاع دهید:

- اسهال، اتساع شکم، درد شکمی
- تب، لرز
- تهوع، استفراغ و حساسیت شکم در لمس

تشخیص

این بیماری اغلب با سونوگرافی تشخیص داده می شود.

درمان

- درمان این بیماری شامل موارد زیر می باشد:
- استراحت روده (ممکن است پزشک مدتی اجازه ی مصرف غذا به کودک ندهد تا روده ها استراحت نمایند).
 - نظارت دقیق بیمار با استفاده از معاینات مرتب شکم
 - تجویز سرم و تزریق خون و پلاکت در صورت نیاز
 - تزریق آنتی بیوتیک های
 - ارسال کشت خون از نظر قارچ و شروع داروی ضد قارچ در صورتی که درمان به آنتی بیوتیک جواب ندهد.
 - عدم مصرف داروهایی مانند داروهای ضد اسهال و مواد مخدر زیرا باعث بدتر شدن وضعیت بیمار می شود.
 - قطع کلیه داروهای شیمی درمانی

