


مراقبت از کاتتر

کاتتر یا شالدون چیست؟

لوله وریدی مرکزی یا کاتتر، لوله باریک و نرمی است که از طریق گردن یا شانه، داخل سیاهرگ مرکزی گردن قرار میگیرد و ممکن است موقت یا دائمی باشد. نوع دائم یا کاف دار، یک تا سه سال استفاده میشود و نوع موقت یا بدون کاف، حداکثر تا یک ماه (گاهها بیشتر) قابل استفاده است.




برای انجام همودیالیز ما به دورگ نیاز داریم. این لوله دو شاخه دارد؛ از یک شاخه خون از بدن خارج می شود و داخل دستگاه دیالیز تصفیه می شود و از شاخه دیگر، خون تصفیه شده وارد بدن بیمار می شود.



چگونگی گذاشتن لوله ورید مرکزی

عمل کاتتر گذاری در اتاق عمل و به صور سرپایی و بدون بیهوشی، با بی حسی موضعی انجام می شود. در صورت امکان، شب قبل از عمل لوله گذاری بهتر است استحمام کنید.

بعد از بی حسی یک سر کاتتر از طریق یک برش کوچک تا نزدیکی قلب هدایت شده و سر دیگر آن چند سانتی متر خارج از پوست بخیه می شود. این سر که دو شاخه است همیشه باید توسط پیچ های استریل بسته باشد و فقط پرستار دیالیز به وسیله آن بیمار را به دستگاه وصل میکند.



یکی از عوارض مهم و شایع کاتتر عفونت است. برای پیشگیری از عفونت رعایت نکات زیر ضروری است:

✓ دست های خود را مخصوصاً پس از توالت با آب و صابون بشویید.



✓ از خاراندن پوست اطراف کاتتر و دست زدن به آن پرهیز کنید.

✓ پانسمان کاتتر را خیس نکنید.



✓ بعد از استحمام پانسمان را تعویض کنید.

✓ پانسمان را در منزل و به صورت غیر استریل تعویض نکنید.

✓ هیچ نوع پمادی را بدون اجازه پزشک روی کاتتر ننماید.

✓ مواظب باشید کاتتر کشیده یا تا نشود.

✓ هرگز سر پیچ های دو شاخه را دستکاری نکنید و اگر باز شد، سریع ببندید.

✓ هرگز بست های قرمز و ابی را دستکاری نکنید و اگر باز شد فوراً ببندید.



✓ مصرف هرگونه داروی تزریقی یا خون گیری از طریق کاتتر ممنوع است.

✓ بیمار و پرستار هردو ملزم به استفاده از ماسک در هنگام کار با کاتتر هستند.



• در صورت مشاهده‌ی هر یک از علائم زیر به مرکز درمانی مراجعه کنید:

✓ تب یا لرز



✓ قرمزی، التهاب یا ترشح چرکی از محل ورود لوله ورید مرکزی به پوست

✓ تورم دست یا بازو



✓ عدم کارایی در حین دیالیز

✓ اگر به هر دلیل لوله ورید مرکزی از گردن شما خارج شد یا بخیه‌های آن باز شد، سعی نکنید آن را سر

جایش برگردانید. محل آن را با یک گاز استریل 20 دقیقه فشار دهید و روی آن چسب محکمی بزنید و سپس

به مرکز درمانی مراجعه کنید.

