




آموزش به بیمار

دیالیز و بیماری هپاتیت



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان کودکان دکتر شیخ

کد سند: DSKH-PAM0

تاریخ تدوین: بهمن ۹۳ بازنگری هشتم: خرداد ۱۴۰۴

بازنگری بعدی: مهر ۱۴۰۶

* در صورت مراجعه کودک به دندانپزشکی، آزمایشگاه، پزشک و یا هر جای دیگر که امکان انتقال ویروس از کودک به آنها می باشد، حتما آنها را از آلوده بودن کودک آگاه کنید.

برای دسترسی به مطالب آموزشی
بیشتر بارکد را اسکن کنید



دسترسى به کانال
آموزشى
در پیام رسان ایتا

در صورت بروز هرگونه مشکل در مراقبت از کودک خود، می-توانید همه روزه با پرستاران مجرب حاضر در کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ به صورت حضوری یا از طریق تلفن زیر مشاوری دریافت فرمایید:

تلفن تماس: ۳۷۲۶۹۰۲۱ داخلی ۲۰۲

منبع: <http://www.nursingconsult.com>

واکسیناسیون علیه هپاتیت ب

- * تمام کودکان تحت همودیالیز به جز آنها که مبتلا هستند باید واکسن هپاتیت ب را دریافت نمایند.
- * برای پیشگیری از این بیماری به ۳ نوبت واکسن نیاز می باشد؛
- * زمان تزریق هر نوبت به این صورت است:
(۰ - ۱ - ۶)
- * نوبت اول
- * نوبت دوم: یک ماه بعد از نوبت اول
- * نوبت سوم: ۶ ماه بعد از نوبت اول
- * در بیماران دیالیزی تزریق دو برابر مقدار معمول می باشد.
- * یک ماه پس از آخرین تزریق سطح ایمنی واکسن اندازه گیری می شود.
- * در صورتی که بیش از ۱۰۰ واحد بین المللی در لیتر باشد پاسخ خوب است و اگر ایمنی واکسن ۱۰۰ - ۱۰ واحد بین المللی در لیتر باشد پاسخ ضعیف است.
- * در صورتی که ایمنی کمتر از ۱۰ واحد بین المللی در لیتر باشد به عنوان عدم پاسخ در نظر گرفته می شود و باید واکسیناسیون تکرار شود.
- * ۹۰ تا ۰۹ درصد افرادی که واکسن را دریافت می کنند در برابر ویروس هپاتیت ب ایمنی پیدا می کنند.

اقدامات لازم جهت بیماران مبتلا به هپاتیت ب

- * کودک را هر ۶ ماه یکبار جهت معاینه و انجام آزمایش خون به پزشک ببرید.
- * کلیه اعضای خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر و هرکس دیگری که با کودک زندگی می کند) باید واکسن دریافت


این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکتان باشیم.



کودکانی که تحت انجام همودیالیز هستند در معرض ابتلا به بیماری های عفونی از جمله هپاتیت می باشند.

هپاتیت چیست؟

- هپاتیت یک بیماری ویروسی است که وقتی ویروس آن وارد بدن می شود، کبد را متورم کرده و در فعالیت آن اختلال ایجاد می کند.
- انواع هپاتیت عبارتند از : هپاتیت آ، هپاتیت ب، هپاتیت ث، هپاتیت د و هپاتیت نوع ای.
- در بیماران همودیالیز بیشتر هپاتیت نوع ب شایع می باشد .



هپاتیت ب

این نوع هپاتیت به وسیله یک نوع ویروس ایجاد می شود

که در خون و ترشحات بدن وجود دارد.

راه های انتقال:

این بیماری از طریق تماس جنسی، تزریق خون آلوده، ترشحات بدن و خون فرد آلوده، حجامت و خالکوبی، استفاده مشترک از وسایل فرد آلوده مانند مسواک، تیغ و ریش تراش می باشد.

علائم ابتلا به بیماری هپاتیت ب:

بی اشتها، تهوع، استفراغ، خستگی، بی حالی، درد مفاصل و کاهش وزن.
این بیماری در اکثر موارد با زردی همراه نیست و در صورتی که زردی اتفاق بیفتد ابتدا در سفیدی چشم ها مشاهده می شود و با تیرگی ادرار و روشن شدن مدفوع همراه است.

درمان:

درمان خاصی برای این بیماری وجود ندارد. بیمار باید از غذاهای پرچرب پرهیز کرده و بیشتر از مواد قندی و مایعات استفاده کند.

استفاده از داروهای ضد ویروس (ریبویرین، آسیکلوویر و ...) نیز کمک کننده می باشد.

بهترین راه پیشگیری از بروز بیماری واکسیناسیون در افراد در معرض خطر می باشد.

