



آموزش به بیمار

شکاف کام



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان کودکان دکتر شیخ
واحد آموزش به بیمار

تاریخ تدوین: بهمن ۹۳ بازنگری هشتم: خرداد ۱۴۰۴

بازنگری بعدی: مهر ۱۴۰۶



برای دسترسی به مطالب آموزشی
بیشتر بارکد را اسکن کنید

در صورت بروز هرگونه مشکل در مراقبت از کودک خود، می‌توانید همه
روزه با پرستاران مجرب حاضر در کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع
در درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ به صورت حضوری یا از طریق تلفن زیر
مشاوره دریافت فرمایید:

تلفن تماس: ۳۷۲۶۹۰۲۱ داخلی ۲۰۲

صبح‌ها: ساعت ۸ الی ۱۲

منبع:

<http://www.nursingconsult.com>

♦ در صورت مواجهه با هریک از موارد زیر به
پزشک معالج مراجعه نمایید:

- (۱) تب بالای ۳۸ درجه
- (۲) خونریزی و یا ترشح زرد رنگ یا بدبو از زخم
- (۳) تنفس های بد بو
- (۴) عدم پاسخ درد به استامینوفن
- (۵) عدم بهبود تهوع، استفراغ، و تب و خونریزی
عوارض عمل جراحی:

♦ در پزشکی هیچ نوع عمل جراحی وجود ندارد که بدون
عارضه باشد، منتهی میزان عوارض و شدت آن در هر عمل
جراحی متفاوت است. جراحی شکاف کام نیز می‌تواند
همراه با چند عارضه باشد، ولی حتمی نیست.

♦ عوارض جراحی شامل:

♦ خونریزی و عفونت

♦ عفونت گوش

♦ تاخیر در گفتار

♦ تاخیر در رشد دندان هاو نیاز به ارتودنسی
دارند.

♦ مراقبت های بعد از بهبود عمل جراحی:

♦ مراجعه جهت گفتار درمانی

♦ مراجعه جهت ارتو دنسی

♦ مراجعه به روانشناس کودکان

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکتان باشیم.



شکاف کام

شکاف کام زمانی اتفاق میافتد که سقف دهان به طور کامل بسته نمیشود و یک حفره میتواند به داخل حفره بینی کشیده شود باقی بماند و حفره بینی و دهان را به هم متصل میکند.

شکاف کام ممکن است در کام نرم و ممکن است به کام سخت نیز برسد.

◆ نکته: تا قبل از انجام عمل جراحی جهت تغذیه کودک حتما باید از شیشه شیر های مخصوص کودکان شکاف کام استفاده نمود. این شیشه ها با توجه به ظاهر مخصوص از بلع هوای اضافه هنگام تغذیه و نفخ کودک پیشگیری میکند. واز پریدن شیر به حلق بیمار و از عفونت ریه و عفونت گوش پیشگیری مینماید.

◆ علائم شکاف کام:

◆ مشکل در تغذیه و بلع دشوار و امکان خروج مایعات ازبینی

علل ایجاد:



1. تماس مادر با سموم
2. دیابت و چاقی مادر حین بارداری
3. مصرف سیگار در دوران بارداری
4. مصرف دارو های خاص در دوران بارداری
5. دریافت نکردن مواد مغذی کافی مانند اسید فولیک قبل از بارداری

تشخیص:

◆ تشخیص آن با معاینه کودک توسط پزشک است. برای تشخیص این ناهنجاری با آزمایشات مایع آمینوتیک توسط فوق تخصص بیماری های جنین در هفته های ۱۲ تا ۱۶ بارداری و یا انجام سونوگرافی در هفته های ۲۲ تا ۳۲ بارداری قابل تشخیص است.

درمان:

◆ این بیماران تا حدود سن ۹ الی ۱۸ ماهگی مورد عمل جراحی قرار میگیرند . با توجه به وسعت شکاف کام ممکن است چندین نوبت مورد عمل جراحی قرار بگیرند.

تیم درمان شامل:

- ◆ فوق تخصص جراحی پلاستیک
- ◆ فوق تخصص جراح اطفال
- ◆ متخصص گوش حلق و بینی
- ◆ متخصص دندانپزشکی اطفال
- ◆ شنوایی سنج

مراقبت های بعد از عمل:

- ◆ استفاده از مسکن جهت کاهش بی قراری کودک.
- ◆ روش تغذیه پس از عمل یکی از مهمترین نکات مراقبتی میباشد.دبرای تغذیه کودک حتما باید با استفاده از سرنگ و قطره چکان مایعات صاف شده به کودک بدهید .
- ◆ تحت هیچ شرایطی برای کودک نباید از شیشه شیر و پستانک و قاشق و چنگال جهت تغذیه استفاده شود.
- ◆ کودک اجازه شیر خوردن و مکیدن انگشت شصت و یا پستان مادر را ندارد.
- ◆ به مدت یک هفته پس از عمل فقط باید مایعات نرم صاف شده تغذیه کنند.
- ◆ مواد غذایی جامد و خوراکی های سفت و سخت به مدت دو هفته پس از عمل استفاده نکنند.

