


اصول عمومی تجویز دارو

- خوانا بودن دستورات دارویی و اجتناب از بد خط نوشتن دستورات دارویی
- محدود نمودن دستور تلفنی و شفاهی به ویژه در خصوص داروها با آوای مشابه و استفاده از تکنیک بازخوانی مجدد در موارد ضروری
- به خاطر سپردن ۸ قانون مرتبط به داروها در هنگام نسخه نویسی و دادن دارو به بیمار
- تاکید بر عادت به بررسی و کنترل داروها
- کادر درمان همیشه قبل از کشیدن دارو برچسب مشخصات آن را بخوانند .
- بررسی و کنترل 8 Rs در هنگام نسخه نویسی ، نسخه پیچی و دادن دارو
- تاکید بر ضرورت خواندن دقیق مشخصات دارویی در هر بار تجویز و عدم اتکاء به تشخیص دیداری ، مکان دارو و ...
- خودداری از کاربرد اختصارات در حین ارائه خدمات دارویی
- آموزش کادر بالینی ذیربط در ارتباط با داروها با اسامی و اشکال مشابه
- نصب برچسب زرد رنگ بر روی داروهای با اسامی و اشکال مشابه به نحوی که مشخصات دارو خوانا باشد
- نصب برچسب قرمز رنگ بر روی داروهای پر خطر به نحوی که مشخصات دارو خوانا باشد
- خودداری از قرار دادن الکترولیت های با غلظت بالا با اشکال مشابه در استوک پرستاری
- جلب مشارکت بیماران و خانواده یا مراقبین در مراقبت دارویی به منظور کاهش خطر

همکار گرامی قبل از تزریق دارو به بیمار ۸ اصل زیر حتما توجه فرمایید !



راهنمای داروهای حیاتی یا نجات بخش

داروهایی هستند که به صورت بالقوه اثر حفظ جان و زندگی انسان ها را داشته و بایستی در تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت موجود باشند و در صورت لزوم بلافاصله به بیمار رسانیده شوند . در لیست داروهای حائز اهمیت برای کودکان زیر ۵ سال، داروهای پنومونی، اسهال، مالاریا، سپسیس نوزادی، HIV/AIDS و کمبود ویتامین A موجود است. داروهای مراقبت تسکینی و درد نیز در لیست داروهای حائز اولویت قرار دارد. آنتی دوت ها و تمامی داروهای ترالی اورژانس و سایر داروهایی که ممکن است به منظور درمان بیماری های بالقوه کشنده مثل آنژیوادم موروئی کاربرد داشته باشند، نیز در این دسته قرار می گیرند.

داروهای ضروری

داروهایی هستند که جهت درمان بیماران هر بخش ضروری می باشند و باید در بخش موجود باشند ، ولی برای رساندن آنها به بیمار زمان داریم و جان بیمار را تهدید نمی کند .

راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه

- نظارت بر ارائه خدمت دارویی کادر حرفه ای جدیدالورود و اطمینان از وجود کادر شایسته و با صلاحیت
- اطمینان از سازمان دهی و نظم تمامی انبارهای دارویی
- تفکیک فیزیکی داروها با اسامی و اشکال مشابه در تمامی انبارهای دارویی
- تفکیک برخی از قرص های مشابه به لحاظ شکل، رنگ و...
- **الصاق برچسب زرد** رنگ و نام دارو (با فونت حداقل ۴۸ که از دور خوانا باشد) بر روی ظروف نگهداری داروهای مشابه در انبار
- تفکیک اشکال مختلف آماده یا دوزهای متفاوت از یک دارو با اسامی و بسته بندی مشابه و **الصاق برچسب زرد بر روی دارو**

راهنمای داروهای با هشدار بالا

احتیاطات لازم در مصرف و تجویز

- ممنوعیت دسترسی آزاد به داروهای با هشدار بالا
- الصاق برچسب قرمز رنگ و نام دارو (با فونت حداقل ۴۸ که از دور خوانا باشد) بر روی ظروف نگهداری داروهای با هشدار بالا در انبار
- محدودیت در تجویز داروهای با هشدار بالا به صورت شفاهی با تلفنی
- استفاده از حروف درشت جهت نوشتن نام دارو در هنگام دستور دارویی
- استفاده از برچسب هشدار دهنده به منظور جلب نظر کاربران در هنگام تجویز داروهای با هشدار بالا
- تجویز و آماده سازی داروهای با هشدار بالا توسط دو نفر از کادر حرفه ای به صورت مستقل از یکدیگر
- جداسازی فیزیکی ویال کلرید پتاسیم و فسفات پتاسیم از سایر داروها
- قرار دادن ویال های هپارین و انسولین در محفظه های جدا و دور از یکدیگر
- توجه به داشتن برچسب دقیق مشخصات برای تمامی داروهای وریدی ضد انعقاد جهت انبار کردن دارو
- محدودیت دسترسی به محلول های کلرید سدیم با غلظت بیش از ۰/۹ درصد
- استفاده از چک دوگانه در تمامی موارد تجویز محلول های الکترولیتی با غلظت بالا (مشمول بر سالیین هیپرتونیک (۳٪ و ۵٪) و کلرید سدیم ۱۴/۶٪ و کلرید پتاسیم (2mEq/mL)، فسفات پتاسیم، سولفات منیزیم و کلرید کلسیم) و سایر داروهای با هشدار بالا در پیوست
- چک دوگانه دستور پزشک جهت تأیید دوز صحیح دارو

- استفاده از برچسب قرمز رنگ برای داروهای با هشدار بالا در ترالی اورژانس جهت جلب توجه کاربران